

使用前请务必认真阅读本说明书，同时请妥善保管，以方便在必要时随时取阅。

第3类医药品

用于咽喉杀菌、消毒及去除口臭的口腔内杀菌消毒药

Isodine®漱口药

Isodine 漱口药是一种含有有效成分聚维酮碘的漱口药。对口腔及咽喉具有非常好的杀菌和消毒效果。

特点

- 有效成分聚维酮碘的碘处于游离状态，对于细菌、真菌、病毒等各种微生物均具有快速杀菌、消毒的作用。
- 因 Isodine 漱口药的有效成分聚维酮碘具有杀菌、消毒作用，通过漱口可实现清洗效果，因此对于口腔内及咽喉的杀菌、消毒及去口臭具有很好的效果。



使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

以下人群请勿使用

因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群

咨询事项

1. 以下人群使用前请咨询医生、药剂师或注册销售商。

- (1) 因药物等引发过过敏症状的人群
- (2) 有下列症状的人群
口内严重溃烂
- (3) 接受过以下诊断的人群
甲状腺功能障碍

2. 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商

相关部位	症状
皮肤	起疹、发红、发痒
口	粗糙、刺痛、灼热感、刺激感

相关部位	症状
消化系统	恶心
其他	不适感

偶尔会出现下述重症。

此时，请立即接受医生治疗。

症状名称	症状
休克（过敏性）	使用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、咽喉发痒、气闷、心悸、意识不清楚等。

3. 使用 5~6 天症状仍不见改善时，请中止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商。

功效及效果

口腔内及咽喉的杀菌、消毒、洗净及去除口臭

用法及用量

1 次取本品 2~4ml，用约 60ml 水稀释，每天漱口多次。

（用法及用量相关注意事项）

- 请严格遵守规定的用法及用量。
- 儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。
- 本品仅用于漱口，请勿用在有伤口或烧伤的地方或者口服。
- 请注意不要让本品进入眼中。万一进入眼中，请立即用凉水或温水清洗。另外，症状较严重时，请接受眼科医生治疗。
- 使用本品时，稀释后请尽快使用。

成分及含量

1ml 中 聚维酮碘 70mg（有效碘 7mg）

含有乙醇、L-薄荷醇、糖精钠、香料等添加剂。

〈成分及含量相关注意事项〉

- 使用本品可能会导致含银的牙科材料（假牙等）变色。

保管及使用注意事项

- (1) 请在避免阳光直射的阴凉场所密封保管。
- (2) 请在儿童无法触及的地方保管。
- (3) 请勿移至其他容器中。
（可能导致误用或变质。）
- (4) 附着到衣服等上面可能会染色，请注意。
另外，如果不慎附着，请立即用水仔细清洗干净。
- (5) 请勿使用过期产品。

● 提供 OTC 医药品的外语产品信息时的相关免责声明

- 本产品是旨在日本国内销售及使用的，根据日本医药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性确保等相关法律，获得批准的医药品。
- 外语产品信息是从该产品的日语附件翻译过来的，仅作为参考信息进行提供，但并非保证其记载内容及该产品本身适合日本国外的法律法规。
- 外语产品信息是本公司临时翻译的，不对该翻译内容作出保证。此外，今后可能会进行修改或变更，恕不预先通知，敬请谅解。
- 关于外语产品信息的记载内容所引发的问题，本公司不承担任何责任。