使用前请务必认真阅读本说明书，同时请妥善保管，以方便在必要时随时取阅。

Isodine®伤口喷剂

第 3 类医药品

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）
以下人群请勿使用　因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群

咨询事项

1. 以下人群使用前请咨询医生、药剂师或注册销售商。(1) 接受医生治疗的人群　(2) 因药物等引发过过敏症状的人群　(3) 患处范围较大的人群　(4) 伤口较深或烧伤严重的人群　**2. 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，请立即中止使用，并携带本药盒咨询医生、药剂师或注册销售商**
偶尔会出现下述重症。此时，请立即接受医生治疗。

相关部位	症状
皮肤	起疹、发红、发痒

症状名称	症状
休克（过敏性）	使用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、咽喉发痒、气闷、心悸、意识不清楚等。

3. 使用 5～6 天症状仍不见改善时，请中止使用，并携带本药盒咨询医生、药剂师或注册销售商。

功效及效果 刀伤、刺伤、擦伤、鞋子磨伤、烧伤等患处的杀菌、消毒、脓疱疮、脓肿等感染皮肤表面的杀菌和消毒

用法及用量 每日数次涂于患处。**（用法及用量相关注意事项）**●儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。●请注意不要让本品进入眼中。万一进入眼中，请立即用凉水或温水清洗。另外，症状较严重时，请接受眼科医生治疗。●本品仅能外用，请勿口服、漱口或用于粘膜的杀菌和消毒。●请严格遵守规定的用法及用量。●与肥皂等一起使用可能会减弱本品的杀菌和消毒作用，因此，请将肥皂洗净后再使用。

成分及含量 1ml 中　聚维酮碘 100mg（有效碘 10mg）
含有甘油、柠檬酸、磷酸氢钠、聚桂醇、pH 调节剂等添加剂。

保管及使用注意事项 (1) 请在避免阳光直射的阴凉场所密封保管。(2) 请在儿童无法触及的地方保管。(3) 请勿移至其他容器中。（可能导致误用或变质。）(4) 附着到衣服等上面可能会染色，请注意。另外，如果不慎附着，请立即用水仔细清洗干净。(5) 请勿使用过期产品。

妥当的伤口护理

❶护理前请用肥皂认真洗手。

❷如果伤口处有泥沙等异物，用流水冲洗干净。

❸用清洁棉球等充分蘸取本品，由中心向外扩散涂抹，然后自然干燥。

※用急救绷带等保护伤口时，请在本品干燥后再缠上绷带。

●提供 OTC 医药品的外语产品信息时的相关免责事项
・本产品是旨在日本国内销售及使用，根据日本医药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性确保等相关法律，获得批准的医药品。
・外语产品信息是从该产品的日语附件翻译过来的，仅作为参考信息进行提供，但并非保证其记载内容及该产品本身适合日本国外的法律法规。
・外语产品信息是本公司临时翻译的，不对该翻译内容作出保证。此外，今后可能会进行修改或变更，恕不预先通知，敬请谅解。
・关于外语产品信息的记载内容所引发的问题，本公司不承担任何责任。

®: Isodine is a registered trademark of Mundipharma.