使用前請務必認真閱讀此說明文件,並將其妥善保管以便在日後需要時隨時查閱

Isodine®傷口噴劑

第3類醫藥品



★ 使用上的注意事項

禁止事項

(若不遵守,現在的症狀會惡化,或者容易引發副作用) 下列的人請勿使用 曾因本藥劑或本藥劑的成分,引發過敏症狀的人

諮詢事項

1. 下列的人於使用前,請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。(1) 正在接受醫師治療的人 (2) 曾因藥品等,引發過敏症狀的人 (3) 患部為廣範圍的人 (4) 有深的傷口或嚴重燙傷的人 2. 使用後, 出現下列症狀時, 有 相關部位 症狀 可能是副作用,請立刻停止使用,攜帶此藥盒,詢諮醫師、藥劑師或登錄販賣者 皮膚 發疹、發紅、發癢 偶尔会出现下述重症。此时,请立即接受医生治疗。

症狀名稱	症狀
休克(過敏性)	使用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

3. 使用 5~6 天症状仍不见改善时,请中止使用,攜帶此藥盒,詢諮醫師、藥劑師或登錄販賣者

療效及效果刀傷、刺傷、擦傷、鞋子磨傷、燙傷等患處的殺菌、消毒,膿痂疹、膿皰等感染皮膚面的殺菌和消毒

用法及用量每日數次塗於患處。**(用法及用量相關的注意事項)**●使兒童使用時,請在家長的指導監督下使其使用。●請注意不要 進入眼睛。萬一進入眼睛時,請馬上以水或溫水沖洗。另外,症狀嚴重時,立刻接受眼科醫師的診療。●<u>本品僅能外用,請勿口服、</u> 漱口或用於粘膜<u>的殺菌和消毒。</u>●請嚴格遵守規定的用法及用量。●與肥皂等一起使用可能會減弱本品的殺菌和消毒作用,因此, 請將肥皂洗淨後再使用。

成分及分量 1ml 中 聚维酮碘 100mg (有效碘 10mg)

含有甘油、檸檬酸、磷酸氫二鈉、聚桂醇、pH 調節劑等添加劑。

保管及使用上的注意事項(1) 請密封保管於陽光直射不到的陰涼處。(2) 請保管於兒童拿不到的地方。(3) 請勿換裝於其他容器。(可 能導致誤用或變質。)(4)附著到衣服等上面可能會染色,請注意。另外,如果不慎附著,請立即用水仔細清洗乾淨。(5)請勿使用 過期產品。

妥當的傷口護理

- ●護理前請用肥皂仔細洗手。
- 2 若傷口有泥沙等異物,用流水沖 洗乾淨。
- **3**用清潔棉球等充分蘸取本品,由 中心向外塗抹, 待自然乾燥。
- ※用繃帶等保護傷口時,請在本品 乾燥後再纏上繃帶。

- ●關於提供 OTC 醫藥品外語產品資訊的免責事項
- 本產品是根據確保日本醫藥品、醫療器械等的質量、有效性及安全性等相關的法律,批准在日本國內銷售及使用的醫藥品。
- 外語產品資訊是該產品日語說明的翻譯,僅作為參考資訊提供,並不保證其記載內容和產品本身符合日本國外的法律法規。
- 外語產品資訊是本公司的臨時翻譯,不保證該翻譯內容的準確性。此外,今後可能會對其進行修改或更改,恕不另行通知。
- •對於由外語產品資訊的內容引起的任何問題,本公司均不負任何責任。