

この説明文書は使用前に必ずお読みください。また必要なとき読めるように保存しておいてください。

指定医薬部外品 手指・皮膚の洗浄・消毒に

イソジン® 泡ハンドウォッシュF


金色の泡のチカラを、感染症が気になる季節に。
イソジン®うがい薬と同じ有効成分
ポビドンヨードを配合。

△ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

次の人は使用しないでください

- 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- 患部が広範囲の人
- 深い傷やひどいやけどの人

相談すること 

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください

- 医師の治療を受けている人
- 本人または家族がアレルギー体質の人
- 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人

2. 次の場合は、副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って

医師または薬剤師にご相談ください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさなどとともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

用法・用量

本剤の適量を手指にとり、塗布または塗擦する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 本剤は外用のみに使用し、内服やうがいには使用しないでください。
- 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 石けんなどとの併用は本剤の殺菌・消毒作用を弱めることがありますので石けん分を洗い落としからご使用ください。

成分・分量

1mL中 ポビドンヨード75mg (有効ヨウ素として7.5mg)
添加物として、ラウリル硫酸ナトリウム、ジオクチルソジウムスルホサクシネート、pH調整剤を含有しています。

保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します。)
- 衣服などに付着した場合は、すぐに水でよく洗い落としてください。
- 銀を含有する製品を変色させるので、貴金属類は外してからご使用ください。
- 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、
または下記までお願いいたします。

シオノギヘルスケア株式会社【医薬情報センター】

電話：【大阪】06-6209-6948 受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)
【東京】03-3406-8450

「副作用被害救済制度」について

(独)医薬品医療機器総合機構

電話：0120-149-931 (フリーダイヤル)

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html