

この説明文書は使用前に必ずお読みください。また必要なとき読めるように保存しておいてください。

第3類医薬品 真菌・細菌からウイルスまで殺菌・消毒

イソジン®きず薬

きり傷・すり傷とびひ・おできなどに

⚠️ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

次の人は使用しないでください

本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (3) 患部が広範囲の人
- (4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

効能・効果

きり傷、さし傷、すりむき傷、靴ずれ、やけどなどの患部の殺菌・消毒
とびひ、おできなどの感染皮膚面の殺菌・消毒

用法・用量

1日数回、患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 本剤は外用のみに使用し、内服、うがいや粘膜の殺菌・消毒には使用しないでください。
- 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 石けんなどの併用は本剤の殺菌・消毒作用を弱めることがありますので石けん分を洗い落としてからご使用ください。

成分・分量

1mL中 ポビドンヨード100mg (有効ヨウ素として10mg)
添加物として グリセリン、クエン酸、リン酸一水素ナトリウム、ラウロマクロゴール、pH調整剤を含有しています。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します。)
- (4) 衣服などに付着すると着色しますのでご注意ください。
なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」

電話：【大阪】06-6209-6948 受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)
【東京】03-3406-8450

「副作用被害救済制度」について

(独)医薬品医療機器総合機構

電話：0120-149-931 (フリーダイヤル)

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html