

## Isodine®药用泡沫洗手液 F

## ⚠ 使用注意事项

## 禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化, 或容易出现副作用)

## 以下人群请勿使用

- (1) 因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群
- (2) 患处范围较大的人群
- (3) 伤口较深或烧伤严重的人群

## 咨询事项

## 1. 以下人群使用前请与咨询医生或药剂师。

- (1) 正在接受医生治疗的人群
- (2) 本人或家人为过敏体质的人群
- (3) 因药物引发过过敏症状的人群

## 2. 以下情况请立即中止使用, 并携带本说明书向医生或药剂师咨询。

- (1) 使用后出现以下症状时

相关部位	症状
皮肤	起疹、发红、发痒

偶尔会出现下述重症。

此时, 请立即接受医生治疗。

症状名称	症状
休克(过敏性)	使用后立即出现荨麻疹、浮肿、胸闷等症状的同时, 还表现出脸色发白、手脚冰凉、出冷汗、气闷等。

- (2) 使用 5~6 天症状仍不见改善时

## 功效及效果

手指、皮肤的清洗和消毒

## 用法及用量

用手指取适量本品, 进行涂抹或擦拭。

## (用法及用量相关注意事项)

## ● 请用流水冲洗。

● 请严格遵守规定的用法及用量。

● 儿童使用时, 请在监护人的指导监督下使用。

● 请注意不要让本品进入眼中。万一进入眼中, 请立即用凉水或温水清洗。另外, 症状较严重时, 请接受眼科医生治疗。

## ● 本品仅能外用, 请勿口服或漱口。

● 与肥皂等一起使用可能会减弱本品的清洗、消毒作用, 因此, 请将肥皂清洗干净后再使用。

## 成分及含量

1mL 中 聚维酮碘 75mg (有效碘 7.5mg)

含有月桂硫酸酯钠、琥珀辛酯磺酸钠、pH 调节剂等添加剂。

## 保管及使用注意事项

- (1) 请在避免阳光直射的阴凉场所保管。
- (2) 请在儿童无法触及的地方保管。
- (3) 请勿移至其他容器中。(可能导致误用或变质。)
- (4) 附着到衣服等上面时, 请立即用水仔细清洗干净。
- (5) **本品会使含银的产品变色, 因此使用时请摘下贵金属等。**
- (6) 请勿使用过期产品。

## ● 提供 OTC 医药品的外语产品信息时的相关免责事项

· 本产品是旨在日本国内销售及使用的, 根据日本医药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性确保等相关法律, 获得批准的医药品(或指定医药部外品)。

· 外语产品信息是从该产品的日语附件翻译过来的, 仅作为参考信息进行提供, 但并非保证其记载内容及该产品本身适合日本国外的法律法规。

· 外语产品信息是本公司临时翻译的, 不对该翻译内容作出保证。此外, 今后可能会进行修改或变更, 恕不预先通知, 敬请谅解。

· 关于外语产品信息的记载内容所引发的问题, 本公司不承担任何责任。