

Isodine® 藥用泡沫洗手液 F

⚠ 使用上的注意事項

禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

下列的人請勿使用

- (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人
- (2) 患部為廣範圍的人
- (3) 有深的傷口或嚴重燙傷的人

諮詢事項

1. 下列的人於使用前，請諮詢醫師或藥劑師。

- (1) 正在接受醫師治療的人
- (2) 本人或家人為過敏體質的人
- (3) 曾因藥品引發過敏症狀的人

2. 以下情況請立刻停止使用，並攜帶此說明文件，諮詢醫師或藥劑師。

- (1) 使用後出現下列症狀時

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢

極少可能引發下列嚴重症狀。

該情況下，請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
休克（過敏性）	使用後立即出現蕁麻疹、浮腫、胸悶等症狀的同時，還表現出臉色發白、手腳冰涼、出冷汗、呼吸困難等。

- (2) 使用 5~6 天，症狀也沒有改善時

療效及效果

手指、皮膚的洗淨和消毒

用法及用量

用手指取適量本品，進行塗抹或擦拭。

(用法及用量相關的注意事項)

●請用流水沖洗。

●請嚴格遵守規定的用法及用量。

●使兒童使用時，請在家長的指導監督下使其使用。

●請注意不要進入眼睛。萬一進入眼睛時，請馬上以水或溫水沖洗。另外，症狀嚴重時，立刻接受眼科醫師的診療。

●本品僅能外用，請勿口服或漱口。

●與肥皂等一起使用可能會減弱本品的洗淨、消毒作用，因此，請將肥皂清洗後再使用。

成分及分量

1mL 中 聚維酮碘 75mg (有效碘 7.5mg)

含有月桂基硫酸鈉、磺胺琥珀酸雙辛鈉、pH 調節劑等添加劑。

保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於陽光直射不到的陰涼處。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝於其他容器。(可能導致誤用或變質。)
- (4) 附著到衣服等上面時，請立即用水仔細清洗乾淨。
- (5) **本品會使含銀產品變色，因此使用時請摘下貴金屬等。**
- (6) 請勿使用過期產品。

●關於提供 OTC 醫藥品外語產品資訊的免責事項

- 本產品是根據確保日本醫藥品、醫療器械等的質量、有效性及安全性等相關的法律，批准在日本國內銷售及使用的醫藥品(或指定醫藥部外品)。
- 外語產品資訊是該產品日語說明的翻譯，僅作為參考資訊提供，並不保證其記載內容和產品本身符合日本國外的法律法規。
- 外語產品資訊是本公司的臨時翻譯，不保證該翻譯內容的準確性。此外，今後可能會對其進行修改或更改，恕不另行通知。
- 對於由外語產品資訊的內容引起的任何問題，本公司均不負任何責任。