

使用前请务必认真阅读本说明书，同时请妥善保管，以方便在必要时随时取阅。

第3类医药品

用于咽喉发炎导致的咽喉干涩、咽喉肿痛、咽喉不适、声音嘶哑等症状

Isodine®咽喉喷雾

随时随地喷一下即可。
便携式 Isodine®口腔喷雾。



使用注意事项

禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用)

1. 以下人群请勿使用

因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群

2. 请勿长期连用

咨询事项

1. 以下人群使用前请咨询医生、药剂师或注册销售商。

- (1) 孕妇或有其可能性的人群
- (2)
- (3) 因药物等引发过过敏症状的人群
- (4) 有下列症状的人群 口内严重溃烂
- (5) 接受过以下诊断的人群 甲状腺功能障碍

2. 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商

相关部位	症状	相关部位	症状
皮肤	起疹、发红、发痒	消化系统	恶心
口	粗糙、刺痛、灼热感、刺激感	其他	不适感

偶尔会出现下述重症。
此时，请立即接受医生治疗。

症状名称	症状
休克（过敏性）	使用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、咽喉发痒、气闷、心悸、意识不清楚等。

3. 使用 5~6 天症状仍不见改善时，请中止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商。

功效及效果

适用于咽喉发炎导致的咽喉干涩、咽喉肿痛、咽喉不适、声音嘶哑等症状

用法及用量

每天数次，向咽喉粘膜上喷涂适量本品。

(用法及用量相关注意事项)

- 请严格遵守规定的用法及用量。
- 将喷嘴对准咽喉患处，一边发出“啊”的声音，一边对准喷射 2~3 次。(如果一边吸气一边使用，液体可能会进入支气管或肺部。)
- 儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。
- 本品仅用于喷涂咽喉患处，请勿用在有伤口或烧伤的地方或者口服。
- 请注意不要让本品进入眼中。万一进入眼中，请立即用凉水或温水清洗。另外，症状较严重时，请接受眼科医生治疗。

成分及含量

1ml 中 聚维酮碘 4.5mg (有效碘 0.45mg)
含有 L-薄荷醇、丙二醇、D-山梨醇溶液、甘油、乙醇、香料及其他一种成分的添加剂。

<成分及含量相关注意事项>

使用本品可能会导致含银的牙科材料(假牙等)变色。

保管及使用注意事项

- (1) 请在避免阳光直射的阴凉场所密封保管。
- (2) 请在儿童无法触及的地方保管。
- (3) 请勿移至其他容器中。(可能导致误用或变质。)
- (4) 附着到衣服等上面可能会染色，请注意。
另外，如果不慎附着，请立即用水仔细清洗干净。
- (5) 请勿接近火源。
- (6) 用针等扎喷嘴的尖端，折断时非常危险，请避免此操作。
- (7) 使用本品时最后无法完全喷射完全，会有药液残留在容器内，但装入药液量时考虑了该问题，已确保可喷射标示内容量的药液。
- (8) 请勿使用过期产品。

● 提供 OTC 医药品的外语产品信息时的相关免责事项

- 本产品是旨在日本国内销售及使用时，根据日本医药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性确保等相关法律，获得批准的医药品。
- 外语产品信息是从该产品的日语附件翻译过来的，仅作为参考信息进行提供，但并非保证其记载内容及该产品本身适合日本国外的法律法规。
- 外语产品信息是本公司临时翻译的，不对该翻译内容作出保证。此外，今后可能会进行修改或变更，恕不预先通知，敬请谅解。
- 关于外语产品信息的记载内容所引发的问题，本公司不承担任何责任。