

使用前請務必認真閱讀此說明文件，並將其妥善保管以便在日後需要時隨時查閱

第3類醫藥品

用於喉嚨發炎導致的喉嚨不舒服、喉嚨痛、喉嚨腫、喉嚨不適感、聲音沙啞等症狀

Isodine®喉嚨噴霧

隨時隨地噴一下即可。
可攜式 Isodine®口腔噴霧。



使用上的注意事項

禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

- 下列的人請勿使用
曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人
- 請勿長期連續使用

諮詢事項

- 下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。
 - 孕婦或可能懷孕的人
 - 正在哺乳的人
 - 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
 - 有下列症狀的人 口內嚴重潰爛
 - 接受過下列診斷的人 甲狀腺功能障礙

- 使用後，出現下列症狀時，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
口腔	不舒服、刺痛、灼熱感、刺激感

相關部位	症狀
消化器官	噁心
其他	不適感

極少可能引發下列嚴重症狀。
該情況下，請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
休克(過敏性)	使用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

- 即使使用5~6天，症狀也沒有改善時，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

療效及效果

適用於喉嚨發炎導致的喉嚨不舒服、喉嚨痛、喉嚨腫、喉嚨不適感、聲音沙啞等症狀

用法及用量

每天數次，向喉嚨粘膜上噴塗適量本品。

(用法及用量相關的注意事項)

- 請嚴格遵守規定的用法及用量。
- 將噴嘴對準喉嚨患處，一邊發出“啊”的聲音，一邊對準噴射2~3次。(若一邊吸氣一邊使用，液體可能進入支氣管或肺部。)
- 使兒童使用時，請在家長的指導監督下使其使用。
- 本品僅用於噴塗喉嚨患處，請勿用於傷口或燙傷處，或者用於內服。
- 請注意不要進入眼睛。萬一進入眼睛時，請馬上以水或溫水沖洗。另外，症狀嚴重時，立刻接受眼科醫師的診療。

成分及分量

1ml 中 聚維酮碘 4.5mg (有效碘 0.45mg)
含有 L-薄荷醇、丙二醇、D-山梨糖醇溶液、甘油、乙醇、香料及其他一種成分的添加劑。

<成分及分量相關的注意事項>

- 可能因使用本品導致含銀的牙科材料(假牙等)變色。

保管及使用上的注意事項

- 請密封保管於陽光直射不到的陰涼處。
- 請保管於兒童拿不到的地方。
- 請勿換裝於其他容器。(可能導致誤用或變質。)
- 附著到衣服等上面可能會染色，請注意。
另外，如果不慎附著，請立即用水仔細清洗乾淨。
- 請勿接近火源。
- 用針等刺噴嘴的尖端，若折斷非常危險，請避免此操作。
- 使用本品時最後無法完全噴射乾淨，會有藥液殘留在容器內，但裝入藥液量時考慮了該問題，已確保可噴射標示內容量的藥液。
- 請勿使用過期產品。

●關於提供 OTC 醫藥品外語產品資訊的免責事項

- 本產品是根據確保日本醫藥品、醫療器械等的質量、有效性及安全性等相關的法律，批准在日本國內銷售及使用的醫藥品。
- 外語產品資訊是該產品日語說明的翻譯，僅作為參考資訊提供，並不保證其記載內容和產品本身符合日本國外的法律法規。
- 外語產品資訊是本公司的臨時翻譯，不保證該翻譯內容的準確性。此外，今後可能會對其進行修改或更改，恕不另行通知。
- 對於由外語產品資訊的內容引起的任何問題，本公司均不負任何責任。