

使用前請務必認真閱讀此說明文件，並將其妥善保管以便在日後需要時隨時查閱

第 3 類醫藥品

對真菌、細菌以及病毒均具有殺菌、消毒作用

Isodine[®] 漱口藥 C



使用上的注意事項

禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

下列的人請勿使用

曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人

諮詢事項

1. 下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

- (1) 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
- (2) 口內嚴重潰爛的人
- (3) 接受甲狀腺功能障礙治療的人

2. 使用後，出現下列症狀時，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
口腔	不舒服、刺痛、灼熱感、刺激感

相關部位	症狀
消化器官	噁心
其他	不適感

極少可能引發下列嚴重症狀。
該情況下，請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
休克（過敏性）	使用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

3. 即使使用 5~6 天，症狀也沒有改善時，請停止使用，攜帶此容器，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

療效及效果

口腔內及喉嚨的殺菌、消毒、洗淨，去除口臭

用法及用量

不進行稀釋，直接將適量本品（約 15~20ml）含入口中，漱口 2~3 次，每天漱口數次。

（用法及用量相關的注意事項）

- 請嚴格遵守規定的用法及用量。
- 使兒童使用時，請在家長的指導監督下使其使用。
- 本品僅用於漱口，請勿用於傷口或燙傷處，或者用於內服。
- 請注意不要進入眼睛。萬一進入眼睛時，請馬上以水或溫水沖洗。另外，症狀嚴重時，立刻接受眼科醫師的診療。

成分及分量

1ml 中 聚維酮碘 3.5mg（有效碘 0.35mg）

含有乙醇、甘油、L-薄荷醇、糖精鈉、pH 調節劑、香料及其他一種成分的添加劑。

<成分及分量相關的注意事項>

可能因使用本品導致含銀的牙科材料（假牙等）變色。

保管及使用上的注意事項

- (1) 請密封保管於陽光直射不到的陰涼處。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝於其他容器。
(可能導致誤用或變質。)
- (4) 附著到衣服等上面可能會染色，請注意。
另外，如果不慎附著，請立即用水仔細清洗乾淨。
- (5) 請勿使用過期產品。

●關於提供 OTC 醫藥品外語產品資訊的免責事項

- 本產品是根據確保日本醫藥品、醫療器械等的質量、有效性及安全性等相關的法律，批准在日本國內銷售及使用的醫藥品。
- 外語產品資訊是該產品日語說明的翻譯，僅作為參考資訊提供，並不保證其記載內容和產品本身符合日本國外的法律法規。
- 外語產品資訊是本公司的臨時翻譯，不保證該翻譯內容的準確性。此外，今後可能會對其進行修改或更改，恕不另行通知。
- 對於由外語產品資訊的內容引起的任何問題，本公司均不負任何責任。